

**DE
METRORRHAGIA
DISSERTATIO
INAUGURALIS
QUAM AD...**

Matteo Baccilieri



DE
METRORRHAGIA
DISSERTATIO INAUGURALIS

QUAM
AD MEDICINAE LAUREAM CONSEQUENDAM
IN ANTIQUISSIMO AC CELEBRATISSIMO
ARCHIGYMNASIO PATAVINO

PUBLICAE HABUIT
MATTHAEUS BACCILIERI
VERONENSIS

PATAVII
EX TYPIS VALENTINI CRESCINII

MDCCCXXX





Fluxus sanguinis ex vagina immodicus, et praeternaturalis *metrorrhagiae*, *menorrhagiae*, vel *haemorrhagiae uterinae* nomine designatur. Quum autem variis in foeminarum adjunctis locum habere queat, in plures species divisa est: hinc metrorrhagia menstrua, gravidarum, puerperarum, vetularum dicta. Nos vero, caeteris missis, solum nunc eam considerabimus, quae menstrua appellatur.

Quoties menstrua, apto licet tempore, nimia quantitate erumpunt, vel frequentius effluunt, vel diutius perdurant, metrorrhagiam menstruam dicunt. Quae quidem sanguinis

jactura modo cum impetu fit, ac parum perdurat: alias autem exigua est, ac diuturna, et ubi cessaverit levi de causa revertitur. Priori in casu vocatur *accidentalis*, vel *acuta*, in altero *habitualis*, seu *chronica*. Illud interea monere expedierit, non omnem catameniorum irregularitatem haberi merito posse veluti metrorrhagiam: etenim foeminae sunt, quae frequentius catameniis funguntur, quin tamen inde sanitas laedatur. Despiciendum itaque, utrum fluxus sanguinis functiones perturbet, adeoque morbosus existimari queat.

Metrorrhagiam praecedunt universalis lassitudo, totius corporis gravedo, capitis dolor, vertigines, lumborum pondus, dolores dorsi, ac ventris, spiritus difficilis, cordis palpitatio, anxietas, horripilationes, cum calore alternantes, os siccum, sitis, pulsus subdurus ac frequens, aliquando nausea, et vomitus, animus morosus, sanguis qui effluit, nunc floridus est, nunc in grumos coactus. Accedunt nausea, anorexia, vomituriatio, vomitus, gastrodynia, cardialgia, capitis dolor exasperatur, dolent et artus. Ubi gravior est sanguinis jactura vires collabuntur: pulsus fiunt contracti celeres, obrepunt lipothymiae, extrema frigent, sudores frigidi erumpunt. Demum si affectio per longiores moras invaluerit, cachecticus fit coi-

poris habitus: oculi cavi evadunt: aedema pedes, ac crura occupat, anasarca excitatur, ad concubitus, et generationem impotentia nascitur.

Non est difficile metrorrhagiam activam a passiva distinguere. Ut autem aequum judicium feramus, cum progressa, tam praesentia sedulo attendendum. Si causae incitantes praegressae fuerint, et satis valida sit foeminae constitutio, neque diu adhuc perduraverit sanguinis fluxus, metrorrhagia erit activa. E converso universalis debilitas, ac laxitas, causae debilitantes praegressae, ac fluxus diurnitas monent esse passivam. Illud est addendum scilicet metrorrhagiam passivam non ea omnia prodere symptomata, quae superius memoravimus; sed in ea observari pulsum debilem, universalem atoniam, et cachecticum corporis habitum.

Causae quae metrorrhagiam producere valent multiplices sunt. Praecipuae vero censentur sequentes: 1. causae omnes quae plethorae universali favent; huc attinent enchyma, aromatum, et liquorum spirituosorum abusus: vita deses: longus somnus: consuetae alicujus evacuationis suppressio, 2. Causae quae sanguinem ad generationis partes alliciunt, quo attinent, ictus, lapsus, chorreae protractae, e-

quatio, arctiores vestes, emesis violenta, sternutatio frequens, cachinnus immodicus, pediluvia tepida. 3. Potentiae morbosae quae vel directe, vel sympatice uterum lacerant. Directis accensenda veneris abusus, vel intensum ejus desiderium: pessaria irritantia: cathartica acriora: emenagoga iterata: clysmata acria: tenesmus. Ad causas vero quae sympatico modo agunt gastricae saburrae praesertim sunt referendae. 4. Causae quae nimiam in vasis uterinis distensionem inducere queant, uti partus numerosi, vel difficiles, et abortus. 5. quae laxitatem procreant, et uteri atoniam adducunt, metrorrhagiae passivae viam sternunt. 6. dcmum schirrus ulcus malignum, carcinoma, aut alia hujusmodi localis irritatio.

Prognosis varia est, prout differt sanguinis effluentis quantitas, prout jactura est celerior, aut lentior. Quo brevioribus intervallis revertitur haemorrhagia, tanto ominosior. Inniores ac vetulae plus noxae perferunt, quam quae mediam aetatem emetiuntur: foeminae quae exhibent cutem mollem, et laxam, venas magnas, conspicuas, caeruleas, pulsum plenum, ac frequentem, capillos rufos, aut flavos, et sanguineo temperamento donantur, minus a menorrhagia patiuntur. Contra quae sunt obesae, debiles, et vultu pallido, aegrius haemorrha-

giam uteri ferunt, majoremque inde noxam experiuntur. Siumor mucosus, saniosus, ac foetidus ex vagina effluat, si instituta exploratione nterus durior, profundior deprehendatur; si os úteri sit inaequale, subcallosum; schirrum, carcinoma, vel ulcus malignum adesse dejudica: quo in casu morbus vix aliquam sanationis spem linquit. Animi deliquium fugax non maxime metuendum: contra si illud diu perduret, nec remediis erigatur, si simul extrema frigescant, et membra convellantur: hinc medicinae Parens scriptum reliquit: *si fluxui muliebri convulsio, et animi deliquium superveniat, malum.*

Metrorrhagiam varia ratione curanda pro varia caussarum indole, et ipsius fluxus natura. In primis animi et corporis quies imperanda, vestes statim solvendae, ne externa vasa comprimantur. Aegrotans horizontaliter decumbat supina: atmosphaera sit subfrigida: stragula non sint nimia: victus sit tenuis, ac potiones subacidae et refrigerantes. Alvus clysmatibus emollientibus aperta servetur: a rebus venereis penitus abstinenceatur. Tradita in omni metrorrhagiae casu conveniunt. Alia vero praesidia varia sunt, prout varium est affectionis ingenium. Diligenter itaque attendendum utrum fluxus sit activus, au contra

passivus. Si Metrorrhagia virginem viro maturam, aut robustam foeminam adoriatur, et stimulantibus causis praecesserint, si pulsus sit durus, validus, frequens, et caetera plethoricae conditionis indicia, ad methodum antiphlogisticam confugiendum.

Quamobrem phlebotomia ex brachio statim est instituenda, et pro re nata iteranda. Potus sit frigidus, subacidus: nitratis potassae, tartaris potassae acidulus plurimum emolumenti pollicentur: victus sit tenuis, atque refrigerans. Digitale purpuream maximis extollunt laudibus, qui ipsam in *contrastimulantium* (ita vocant) remedium censu reponunt. Verum cum de his adhuc sub iudice lis versetur, nunquam certo erit, cur a caeteris propositis, et tum ratione indicatis, tum experientia confirmatis auxilii recedamus.

Chronicus sanguinis ex utero fluxus omnino contraria praesidia expostulat, quibus curetur. Ibi in usum vocanda sunt antispasmodica, roborantia, adstringentia. Moschus, aether sulphuricus, liquor anodinus mineralis Hoffmanni, castoreum huc referuntur, oppiatis non oblegatis, tunc praesertim summopere utilis, quando convulsiones, vigiliae, aliaeve subortae a nimia mobilitate, ac sensibilitate turbae sunt compescendae.

Tonicis et adstringentibus pro re nata in metrorrhagia fidenter usurpandis, accensendus cortex peruvianus, cortices quercus, cascarillae, simarubae, salicis cum in substantia, tum et in decocto. Cortex cinnamomi, et acidum sulphuricum passim adhibita quoque utiliter fuerunt. Sunt qui proponunt, nec immerito, ipecacuanham per epictasim assumptam: additio oppii virtutem adauget: hinc pulvis *Dowerii* summo opere celebratus. Superius adnotauimus a gastrica saburra metrorrhagiam foveri; quo in casu iuvant emetica, et purgantia.

Cum efficacem in extremis haemorrhagiis adstringentium virtutem adnotassent medici iisdem, et usi sunt ad haemorrhagias composcendas, quae ab internis causis promanant. Illinc laudantur sulphas martis, sulphas aluminae cum potassa, aqua styptica, terra japonica, sanguis draconis, et ipsumet decoctum corticis aurantiorum. Aquas minerales ferrugineas, praeparata martialia feliciter quoque usurpata accepimus.

Quum sanguinis fluxus internis auxiliis satis prompte compesci non potest, non sunt negligenda remedia externa, quibus saltem cruoris jacturam moderemur. Cataplasma ex synapi aut emplastrum compositum ex duabus emplastri galbani partibus, et una cerati epispa-

stici abdomini applicitum miras utilitates attulit, quod testatur *Weikard*. Linimentum volatile *Boerrhawii*, vel oppiato gastricum, camphora in aethere soluta, tinctura cantharidum, oleum aethereum nucis muschatae, fausto cum successu abdomini illiniuntur, aqua simul frigida, et ipsa glacies contusa per intervalla utiliter apponitur.

Sub maximo sanguinis fluxu juvat quoque aquam frigidam, vel solam, vel cum aceto, sulphate ferri, sulphate alluminae cum potassa, sulphate Zinci in vaginam injicere: Linteum contortum (pessarium) aceto, aut adstringentibus aliis imbutum in vaginam intrudere. Artuum ligaturae olim maximae laudatae, ad sistendas haemorrhagias, quae nostra aetate penitus obsolevere.

Supervacaneum ducimus animadvertere criticam quandoque se sistere metrorrhagiam, quo in casu nonnisi cum gravi detrimento remedia ad ipsam coercendam praescriberentur. Quum a schirro, carcinomate, ulcere aliave locali affectione foveatur metrorrhagia, praeter superius proposita, illa quoque expostulat auxilia, quae a cujuscumque affectionis ingenio indicantur.

Demum metrorrhagiam passae, tum eo vel magis quae in ipsam frequentius proclives

sunt, in apto regimine, et sedula occasiona-
lium causarum fuga prophylaxim praesertim
auspicari debent.